Catarinense PHARMA

I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Figatil

MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

Nomenclatura popular:
Alcachofra
Boldo
Nomenclatura botânica completa:
Cynara scolymus L.
Peumus boldus Molina
Família:
Compositae
Monimiaceae
Parte da planta utilizada:
Folha
Folha

Medicamento fitoterápico registrado com base no uso tradicional, não é recomendado o uso por período prolongado enquanto estudos clínicos amplos sobre sua segurança não forem realizados.

II - APRESENTAÇÃO:

Solução oral concentrada - Cartucho com frasco plástico transparente âmbar contendo 150ml do produto.
Solução oral - Cartucho com 48 flaconetes plásticos transparentes âmbar contendo 10ml do produto.
Forma farmacêutica:
Solução oral concentrada
Solução oral
Concentração:
Solução oral concentrada - 0,8335ml de extrato fluido de alcachofra (*Cynara scolymus* L.), 0,8335ml de extrato fluido de boldo em cada colher de chá (5 ml).
Solução oral - 0,8335ml de extrato fluido de alcachofra (*Cynara scolymus* L.), 0,8335ml de extrato fluido de boldo (*Peumus boldus* Molina) em cada flaconete (10ml).
Quantidade:
Solução oral concentrada - 150 ml
Solução oral - 10 ml
VIA ORAL
USO ADULTO

III - COMPOSIÇÃO

Solução oral concentrada - Cada colher de chá (5 ml) do produto contém 0,8335ml de extrato fluido de alcachofra [*Cynara scolymus* L., equivalente a 0,21% ou 1,75mg de derivados cafeoilquínicos em ácido clorogênico (marcador)], 0,8335ml de extrato fluido de boldo [*Peumus boldus* Molina, equivalente a 0,03% ou 0,25mg de alcalóides totais em boldina (marcador) e excipientes: sacarose, metilparabeno, óleo de laranja, sacarina sódica, hidróxido de sódio 50% e água purificada.
Solução oral - Cada flaconete (10 ml) contém 0,8335ml de extrato fluido de alcachofra [*Cynara scolymus* L., equivalente a 0,21% ou 1,75mg de derivados cafeoilquínicos em ácido clorogênico (marcador)], 0,8335ml de extrato fluido de boldo (*Peumus boldus* Molina, equivalente a 0,03% ou 0,25mg de alcalóides totais em boldina (marcador)] e excipientes: sacarose, propilenoglicol, metilparabeno, óleo de laranja, sacarina sódica, hidróxido de sódio 50% e água purificada.
1ml equivale a 20 gotas. 1 gota contém 0,02mg de princípios ativos.

IV - INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

O produto Figatil® é indicado como colerético e colagogo, e para o tratamento sintomático dos distúrbios gastrointestinais espásticos.

O que é uma substância colerética e colagoga?
Uma substância colerética estimula o fígado a aumentar a produção de bile. Ela aumenta a solubilidade do colesterol, das gorduras e das vitaminas (lipossolúveis), facilitando a sua absorção pelo organismo.
Uma substância colagoga promove o fluxo da bile para o intestino, principalmente em virtude da contração da vesícula biliar.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Figatil® é um medicamento fitoterápico composto por plantas com reconhecidas propriedades digestivas. O boldo e a alcachofra apresentam propriedades coleréticas e colagogas que ajudam na digestão.
O tempo médio de início da ação do medicamento é de cerca de 15 a 30 minutos.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Figatil® não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula.
O Figatil® não deve ser usado por mulheres grávidas, visto que este poderá provocar contrações uterinas e acelerar o parto. Também não deve ser usado durante a amamentação devido à falta de estudos disponíveis. Os princípios ativos amargos podem passar pelo leite materno.
Figatil® é contraindicado nos seguintes casos:
- obstrução do ducto biliar;
- colangite (inflamação das vias biliares);
- câncer no ducto biliar, câncer de fígado ou câncer pancreático;
- doenças hepáticas severas como hepatite virótica, hepatite tóxica ou cirrose;
- cálculos biliares;
- icterícia proveniente de anemia hemolítica e outras causadas por hiperbilirrubinemia não conjugadas;
- inflamação séptica da vesícula biliar.

O medicamento deve ser evitado por crianças menores de 12 anos.
Este medicamento é contraindicado para uso por diabéticos.
Este medicamento é contraindicado para uso por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista [Categoria

C].

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Atenção diabéticos: este medicamento contém SACAROSE.

Interações medicamentosas

Pacientes usando warfarina, devem ser avisados que existe uma possível Interação com Figatil®.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Figatil® solução oral concentrada e solução oral devem ser guardados em sua embalagem original, à temperatura ambiente [15ºC a 30ºC].

O produto Figatil® solução oral e solução oral concentrada apresentam validade de 24 meses.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Após a abertura da embalagem, o produto deve ser guardado adequadamente para se manter próprio ao consumo dentro do prazo de validade.

O produto Figatil® solução oral concentrada apresenta-se como um líquido móvel, de cor castanho avermelhado e com odor de laranja e boldo. Seu sabor é amargo, levemente adocicado e picante.

O produto Figatil® solução oral apresenta-se como um líquido móvel, de cor castanho a castanho avermelhado e com odor de laranja e boldo. Seu sabor é amargo, levemente adocicado e picante.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser utilizado por via de administração não recomendada.

A solução oral e a solução oral concentrada devem ser ingeridas por via oral.

A posologia do Figatil® solução oral concentrada (diluir em água) foi estabelecida como 1 colher de chá (5ml), 1 a 6 vezes ao dia.

A posologia em ml do produto por peso corpóreo é de 0,4ml/kg/dia.

A dose máxima deste medicamento deverá ser 6 colheres de chá (30ml) ao dia, dividida em 6 doses.

A posologia do Figatil® solução oral foi estabelecida como 1 flaconete (10ml), 1 a 6 vezes ao dia.

A posologia em ml do produto por peso corpóreo é de 0,8ml/kg/dia.

A dose máxima deste medicamento deverá ser 6 flaconetes (60ml) ao dia, dividida em 6 doses.

Assim como todos os medicamentos, informe ao seu profissional da saúde todas as plantas medicinais e fitoterápicos que estiver tomando. Interações podem ocorrer entre medicamentos e plantas medicinais e mesmo entre duas plantas medicinais quando administradas ao mesmo tempo.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso você esqueça de tomar uma dose do produto Figatil®, não é necessário tomar a dose esquecida, deve-se apenas tomar a próxima dose, no horário correto.

Nunca tome uma dose dobrada para compensar a dose perdida.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam o medicamento): Figatil® é bem tolerado nas doses terapêuticas descritas na posologia, podendo causar em raros casos distúrbios gastrointestinais ou reações alérgicas em pessoas sensíveis.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

A administração de altas doses pode levar a transtornos nos rins, vômitos, diarreia e espasmos.

Se ocorrer ingestão acidental do produto em doses excessivas, deve-se procurar orientação médica e deve ser considerado o esvaziamento gástrico logo após o incidente.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

Esta bula foi aprovada pela ANVISA em 20/10/2010.

Catarinense PHARMA

Solução Oral Concentrada M.S. 1.0066.0019.004-2
Solução Oral M.S. 1.0066.0019.009-3
Farm. Resp.: Ana Carolina S. Krüger
CRF-SC Nº 6252
Laboratório Catarinense Ltda.
Rua Dr. João Colin, 1053
89204-001 - Joinville - SC
CNPJ 84.684.620/0001-87
Indústria Brasileira
✆ **SAC 0800-474222**
® = marca registrada do Laboratório Catarinense Ltda.
Cód.: 150978 Rev.: 10/2018